

RONA Z. SILKISS

M.D., FACS

안구안면 성형수술, 재건수술 및 안와수술

진료소
400 29th Street, Suite 315
Oakland, CA 94609
전화 510.763.0881
팩스 510.763.0907

안면경련에 대한 Botulinum Toxin 치료 동의서

환자: _____ 연령: _____

환자 유의사항: 귀하는 수술을 받을 것인지를 스스로 결정할 수 있도록 자신의 질환 및 치료에 대해 충분히 정보를 제공받고 수술에 관련된 위험과 위해요소를 알 권리가 있습니다.

이 설명은 귀하를 겁주거나 경고하기 위한 것이 아닙니다. 단지 귀하가 이 치료에 동의하거나 거절할 수 있도록 정보를 보다 충분히 제공하기 위한 것입니다.

본인은 실키스(Silkiss) 박사에게 안면경련을 호전시키도록 보톡스(Botox) 치료를 요청하였습니다. 이것은 Botulinum Toxin의 등록상표입니다. 이 주사는 안면 근육의 근육 경련 문제를 호전시키기 위해 20년 넘게 아동 및 성인들에게 사용되어 왔습니다. 이 독소는 근육의 평형 실조로 인해 발생하는 복시를 교정하는 데 효과를 보여왔습니다. 이 약물은 안검경련, 반측안면경련, 사시의 치료 및 주름 개선에도 사용되는 FDA 승인 약물입니다. 극미량의 주사는 근육을 약화시키므로 경련도 약화시킵니다. 보톡스(Botox)는 주사된 근육의 약화 또는 마비를 가져올 수 있습니다. 시술 결과는 일반적으로 상당한 효과를 보이지만, 본인은 약물 시술이 정밀 과학이 아니며 예상 결과에 관한 어떠한 보장도 없다는 것을 알고 있습니다.

보톡스(Botox) 용액은 작은 바늘을 통해 근육에 주사됩니다. 시술 후 5-7일에 걸쳐 효과가 나타나는 것을 볼 수 있습니다. 효과는 일반적으로 3-6개월간 지속됩니다. 안면경련, 눈꺼풀 처짐 또는 미간 주름은 완화될 수 있습니다. 보고된 부작용 및 합병증은 극미합니다. 때때로 약간의 붓기 및/또는 멍이 생길 수 있으며 주사 후 며칠 간 지속될 수 있습니다. 드물지만 주사 후 몇 주 동안 주변 근육이 약화될 수 있습니다. 이것은 일시적으로 한쪽 또는 양쪽 눈꺼풀의 경미한 처짐을 가져올 수 있습니다. 이것은 주사 시술의 약 1%에서 발생합니다.

본인은 치료에 관련된 위험, 치료의 예상 효과 및 치료를 아예 받지 않는 것을 포함하여 대체 치료법에 대해 조언을 받았습니다. 본인은 최상의 결과를 얻기 위해 여러 차례의 시술이 필요할 수 있다는 것을 알고 있습니다. 본인은 임신한 상태인지 또는 중대한 신경질환을 가지고 있는지를 모릅니다. .

본인은 임상사진을 촬영하는 것과 임상사진을 발행물 및 발표 자료에 과학적 용도로 사용하는 것을 허가합니다. 본인은 자신의 신상정보가 보호됨을 알고 있습니다.

본인은 이것이 충분한 설명이 되었으며 이 설명이 이전의 구두 또는 서면 설명을 대체하는 것에 동의합니다. 본인은 위의 글을 읽고 충분히 이해하였으며 상담 및 질문을 위한 충분한 기회를 가졌음을 인정합니다.

서명 일자

이름