RONA Z. SILKISS
M.D., FACS
CIRUGÍA PLÁSTICA OCULOFACIAL, RECONSTRUCTIVA Y ORBITARIA

OFICINA ADMINISTRATIVA
400 29th Street, Suite 315
Oakland, CA 94609
Teléfono 510.763.0881
Fax 510.763.0907

Consentimiento para la aplicación de la solución oftálmica Latisse

Lea la siguiente información atentamente. Pueden aparecer efectos colaterales y contraindicaciones al usar Latisse, aunque en menor medida.

No debe usar Latisse si es alérgico a alguno de sus componentes. Debe informar a su médico si ocurre lo siguiente:

* Le diagnosticaron previamente problemas de presión ocular
* Se encuentra actualmente tomando medicación para los problemas de presión ocular
* Posee factores de riesgo para desarrollar glaucoma

Los efectos colaterales más comunes de Latisse son picazón y enrojecimiento. Lo ha informado el 4% de los usuarios del ensayo clínico. El uso de Latisse puede causar otros efectos colaterales menos comunes, como por ejemplo, oscurecimiento del párpado, de la piel, irritación de los ojos, sequedad o enrojecimiento de los párpados o pigmentación marrón en aumento de la parte de color del ojo (iris). La pigmentación del iris puede ser permanente.

Si desarrolla una nueva condición ocular (es decir, trauma o infección), padece una repentina disminución de la visión, se somete a una cirugía ocular o desarrolla cualquier reacción ocular o del párpado, debe suspender inmediatamente el uso de Latisse y conversar con su médico.

Mi firma al pie de este documento constituye mi pleno conocimiento sobre los riesgos y efectos colaterales de la solución recetada, Latisse.

Firma _____ Fecha _____