

**Silkiss Eye Surgery**  
**400 - 29<sup>th</sup> Street, Suite 315, Oakland, CA 94609**  
**전화번호 510.763.0881 / 팩스 510.763.0907**

수술 전 2주 동안은 아스피린 또는 비스테로이드성 소염제를 복용하지 마십시오. 만약 쿠마딘(Coumadin), 플라빅스(Plavix), 어그레녹스(Aggrenox) 또는 아래 예시와 같은 기타 혈액 희석제를 복용 중이시라면, 주치의와 상담하여 수술 전에 언제 해당 약물의 복용을 중단해야 할지 결정하십시오. 복용 중단하는 기간은 2주 미만일 수 있습니다. 수술을 받은 다음 날부터 혈액 희석제, 비스테로이드성 소염제를 다시 복용할 수 있습니다. 다른 약물의 경우 평소 계획대로 복용하십시오.

애드빌(Advil)	엠펜린(Empirin)	사베이사 (에독사반) {Savaysa (Edoxaban)}
아그레녹스(Aggrenox) 알리브(Aleve)	엠프라질(Emprazol)	수면유도제
알카 셀처(Alka Seltzer)	이쿠아제식(Equagesic)	세인트 조셉스 감기약(St. Joseph's Cold Tabs)
애너신(Anacin)	엑세드린(Excedrin)	사인오프 감기약(Sine-Off Cold Tablets)
아나프록스(Anaprox)	피오제식(Fiogesic)	스탠백 진통 가루약(Stanback Analgesic Powders)
APC(아스피린, 페나세틴, 카페인 복합제)	피오리날(Fiorinal)	수팩(Supac)
관절염 진통제	어유	시날고스(Synalgos)
관절염용 버퍼린(Arthritis Strength Bufferin)	아마씨유	티클리드(Ticlid)
아스크립틴(Ascriptin)	종합감기약(4-Way Cold Tablets)	트리아미니신정(Triaminicin Tablets)
아스피린(Aspirin)	구디스 두통 가루약(Goddy's Headache Powder)	뱅퀴시(Vanquish)
아스피린 좌제(Aspirin Suppositories)	이부프로펜(Ibuprofen)	비트로메드정(Vitro-Med Tablets)
바이엘 어린이용 감기약(Bayer Children's Cold Tabs)	인도신(Indocin)	바이옥스(Vioxx)
브릴린타(Brilinta)	미돌(Midol)	볼타렌(Voltaren)
버퍼린 A 화합물(Buff-A-Comp)	모트린(Motrin) 나프로신(Naprosyn)	와파린(Warfarin)
버퍼린(Bufferin)	노르제식(Norgesic)	자렐토(리바록사반) 2~3일 {Xarelto (Rivaroxaban) 2-3 days}
카마 인레이징(Cama Inlay Tabs)	오메가 3 지방산	조프린(Zorprin)
세레브렉스(Celebrex)	파비린(Pabirin)	
클로피도그렐(Clopidogrel)	파캡스(Pacaps)	<b>허브류</b>
콘게스페린(Congesperin)	파날제식(Panalgesic)	특정 한약제
코디신 제품(Cordicin Products)	페드라질(Pedrazil)	마늘 알약
쿠마딘 5일(Coumadin 5 days)	퍼코덴(Percodan)	인삼 알약
ASA 다르본(Darvon with ASA)	퍼시스틴(Persistin)	은행 알약
드리스탄(Dristan)	플라빅스 5~7일(Plavix 5-7 days)	생강 알약
에코트린(Ecotrin)	프라닥사 (다비가트란) {Pradaxa (Dabigatran)}	
에독사반(Edoxaban)	콰잇 월드 진통제(Quiet World Analgesic)	<b>타이레놀은 수술 전에 복용하셔도 괜찮습니다.</b>
엘리퀴스 (아픽사반) {Eliquis (Apixaban)}	로박시잘(Robaxisal)	

새로운 당뇨약이나 체중 감량 약은 수술 전에 복용을 중단해야 할 수 있습니다

**GLP 작용제는 수술 전에 투여를 중단해야 합니다.**

매주 투여하고 계시다면, 수술 전 한 주치를 투여하지 마십시오.

매일 투여하고 계시다면, 수술 전 하루치를 투여하지 마십시오.

- 둘라글루타이드 (트루리시티) (주 1회 주사) {Dulaglutide (Trulicity)}
- 서방형 엑세나타이드 (바이두레온) (주 1회 주사) {Exenatide extended release (Bydureon)}
- 엑세나타이드 (바이에타) (일 2회 주사) {Exenatide (Byetta)}
- 세마글루타이드 (오젠펙) (주 1회 주사) {Semaglutide (Ozempic)}
- 세마글루타이드 (리벨서스) (일 1회 경구투여) {Semaglutide (Rybelsus)}
- 세마글루타이드 (웨고비) (주 1회 주사) {Semaglutide (Wegovy)}
- 리라글루타이드 (빅토자, 삭센다) (일 1회 주사) {Liraglutide (Victoza, Saxenda)}
- 리라글루타이드 (애들릭신) (일 1회 주사) {Lixisenatide (Adlyxin)}
- 티제파타이드 (마운자로) (주 1회 주사) {Tirzepatide (Mounjaro)}

**경구 SGLT2 억제제는 전신 마취 수술 전 복용을 중단해야 합니다.**

- 벅사글리플로진 (브렌자비) {Bexagliflozin (Brenzavvy)} 수술 전 3일간 중단
- 카나글리플로진 (인보카나) {Canagliflozin (Invokana)} 수술 전 3일간 중단
- 다파글리플로진 (파시가) {Dapagliflozin (Farxiga)} 수술 전 3일간 중단
- 엠펜글리플로진 (자디앙) {Empagliflozin (Jardiance)} 수술 전 3일간 중단
- 얼투글리플로진 (스테글라트로) {Ertugliflozin (Steglatro)} 수술 전 4일간 중단