

Silkiss Eye Surgery
400 - 29th Street, Suite 315, Oakland, CA 94609
Teléfono 510.763.0881 / Fax 510.763.0907

No ingiera aspirinas ni medicamentos anti-inflamatorios no esteroideos dos semanas antes de la cirugía. Si usted está en tratamiento con Coumadin, Plavix, Aggrenox, u otro medicamento anticoagulante (ver ejemplos debajo) consulte a su médico cuánto tiempo antes de la cirugía debe discontinuar la toma; puede ser menos de dos semanas. Puede retomar el tratamiento con anticoagulantes, aspirinas y anti-inflamatorios no esteroideos **el día después** de la cirugía. La ingesta de otros medicamentos puede continuar en su esquema habitual.

Advil	Empirin	Savaysa (Edoxaban)
Aggrenox Aleve	Empirazil	Sleeping Aid
Alka Seltzer	Equagesic	St. Joseph's Cold Tabs
Anacin	Excedrin	Sine-Off Cold Tablets
Anaprox	Fiogestic	Stanback Analgesic Powders
APC	Fiorinal	Supac
Arthritis Pain Formula	Aceite de pescado	Synalgos
Arthritis Strength Bufferin	Aceite de linaza	Ticlid
Ascriptin	4-Way Cold Tablets	Triaminicin Tablets
Aspirin	Goddy's Headache Powder	Vanquish
Aspirin Suppositories	Ibuprofen	Vitro-Med Tablets
Children's Cold Tabs	Indocin	Vioxx
Brilinta	Midol	Voltaren
Buff-A-Comp	Motrin Naprosyn	Warfarin
Bufferin	Norgesic	Xarelto (Rivaroxaban) 2 a 3 días
Cama Inlay Tabs	Ácidos grasos Omega 3	Zorprin
Celebrex	Pabirin	
Clopidogrel	Pacaps	<u>HIERBAS</u>
Congesperin	Panalgesic	Algunas hierbas chinas
Coridicin Products	Pedrazil	Píldoras de Garlic
Coumadin 5 days	Percodan	Píldoras de Ginseng
Darvon with ASA	Persistin	Píldoras de Gingko
Dristan	Plavix 5-7 days	Píldoras de Ginger
Ecotrin	Pradaxa (Dabigatran)	
Edoxaban	Quiet World Analgesic	Puede tomar Tylenol antes de la cirugía.
Eliquis (Apixaban)	Robaxisal	

Tampoco es necesario interrumpir la toma de medicamentos para la diabetes y la pérdida de peso antes de la cirugía.

Los agonistas del GLP deben interrumpirse antes de la cirugía.

Si toma una dosis semanal, interrumpa la toma una semana antes de la cirugía.

Si toma una dosis diaria, interrumpa la toma un día antes de la cirugía.

Dulaglutide (Trulicity) (inyección semanal)
Exenatide extended release (Bydureon) (inyección semanal)
Exenatide (Byetta) (inyección dos veces al día)
Semaglutide (Ozempic) (inyección semanal)
Semaglutide (Rybelsus) (vía oral una vez al día)
Semaglutide (Wegovy) (inyección semanal)
Liraglutide (Victoza, Saxenda) (inyección una vez al día)
Lixisenatide (Adlyxin) (inyección una vez al día)
Tirzepatide (Mounjaro) (inyección semanal)

Los inhibidores de SGLT2 por vía oral deben interrumpirse antes de una cirugía con anestesia general.

Bexagliflozin (Brenzavvy) INTERRUMPIR 3 días antes de la cirugía.
Canagliflozin (Invokana) INTERRUMPIR 3 días antes de la cirugía.
Dapagliflozin (Farxiga) INTERRUMPIR 3 días antes de la cirugía.
Empagliflozin (Jardiance) INTERRUMPIR 3 días antes de la cirugía.
Ertugliflozin (Steglatro) INTERRUMPIR 4 días antes de la cirugía.