

Silkiss Eye Surgery
400 - 29th Street, Suite 315, Oakland, CA 94609
電話 510.763.0881 / 傳真 510.763.0907

在手術前兩週，請不要服用阿斯匹林或非類固醇類消炎藥。若您正在服用 Coumadin (可邁丁)、Plavix (保栓通)、Aggrenox (腦康平) 或其他其他血液稀釋藥 (範例如下)，請諮詢醫師以確定何時應在手術前停用這種藥物- 可能少於兩週。在手術後的第二天，您可再開始使用血液稀釋劑、阿斯匹林和非類固醇類消炎藥。您應繼續照常服用您的其他藥物。

Advil (雅維)	Empirin	Savaysa (Edoxaban)
Aggrenox Aleve (腦康平蔡普生)	Emprazil	助睡眠藥
Alka Seltzer (我可舒適)	Equagesic	St. Joseph 感冒片
Anacin (安那辛)	Excedrin (伊克賽錠)	Sine-Off 感冒片
Anaprox (蔡普生鈉)	Fiogesic	Stanback 止痛粉
APC (複方阿斯匹林)	Fiorinal	Supac
關節炎止痛配方	魚油	Synalgos
關節炎止痛藥	亞麻油	Ticlid (抵克立得)
Ascriptin	4-Way 感冒片	Triaminicin 片
阿斯匹林	Goddy 頭痛粉	Vanquish
阿斯匹林栓劑	Ibuprofen (布洛芬)	Vitro-Med 片
拜耳兒童感冒片	Indocin (印多新)	Vioxx (偉克適)
Brilinta (布利尼特)	Midol	Voltaren (服他寧)
Buff-A-Comp	Motrin Naprosyn (布洛芬蔡普生)	Warfarin (華法林)
Bufferin (百服寧)	Norgesic (樂肌舒)	Xarelto (利伐沙班) 2-3 天
Cama 嵌入片	Ω3 脂肪酸	Zorprin
Celebrex (西樂葆)	Pabirin	草藥
Clopidogrel (氯吡格雷)	Pacaps	某些中草藥
Congesperin	Panalgesic	蒜丸
Cordicin 產品	Pedrazil	人參丸
Coumadin (可邁丁) 5 天	Percodan	銀杏丸
Darvon (達爾豐) 與阿斯匹林	Persistin	薑丸
Dristan (迪斯坦)	Plavix (保栓通) 5-7 天	
Ecotrin	Pradaxa (Dabigatran (達比加群))	
Edoxaban (艾多沙班)	Quiet World 止痛劑	
Eliquis (Apixaban (阿哌沙班))	Robaxisal	手術前可服用 Tylenol (泰諾)。

您可能還需要在手術前停用新的糖尿病和減重藥物。

手術前需要停用 GLP 激動劑。

若您服用每週劑量，請在手術前一週停用。

若您服用每日劑量，請在手術前一天停用。

Dulaglutide (Trulicity (易週糖)) (每週注射一次)
Exenatide 長效 (Bydureon (穩爾糖)) (每週注射一次)
Exenatide (Byetta (降爾糖)) (每天注射兩次)
Semaglutide (Ozempic (胰妥讚)) (每週注射一次)
Semaglutide (Rybelsus (瑞倍適)) (每天口服一次)
Semaglutide (Wegovy (週纖達)) (每週注射一次)
Liraglutide (Victoza (胰妥善), Saxenda (善纖達)) (每天注射一次)
Lixisenatide (Adlyxin) (每天注射一次)
Tirzepatide (Mounjaro (蒙扎羅)) (每週注射一次)

口服 SGLT2 抑制劑需要在全身麻醉手術前停用。

Bexagliflozin (Brenzavvy) 手術前 3 天停用。

Canagliflozin (Invokana) 手術前 3 天停用。

Dapagliflozin (Farxiga) 手術前 3 天停用。

Empagliflozin (Jardiance) 手術前 3 天停用。

Ertugliflozin (Steglatro) 手術前 4 天停用。