

**Silkiss Eye Surgery**  
**400 - 29<sup>th</sup> Street, Suite 315, Oakland, CA 94609**  
**電話 510.763.0881 / Fax 510.763.0907**

手術の2週間前から、アスピリンや非ステロイド系抗炎症薬を服用しないでください。Coumadin（クマディン）、Plavix（プラビックス）、Aggrenox（アグレノックス）、または以下の例のような、その他の抗凝血薬を服用している場合は、手術前にいつこの薬剤を中止すべきか医師に相談して決定してください。2週間未満の場合もあります。手術の翌日には、抗凝血薬、アスピリン、非ステロイド系抗炎症薬の服用を再開することができます。他の薬の服用は通常通り継続してください。

Advil（アドビル）	Empirin	Savaysa（エドキサバン）
Aggrenox Aleve（アグレノックスアリーブ）	Emprazil	睡眠補助薬
Alka Seltzer（アルカセルツァー）	Equagesic	St. Joseph 風邪薬
Anacin（アナシン）	Excedrin（エキセドリン）	Sine-Off 風邪薬
Anaprox（アナプロックス）	Fiogesic	Stanback Analgesic Powders
APC	Fiorinal	Supac
関節炎鎮痛薬	魚油	Synalgos
関節炎強度バファリン	アマニ油	Ticlid
Ascriptin（アスクリプチン）	総合感冒薬	Triaminic タブレット
Aspirin（アスピリン）	Goddy's Headache Powder	Vanquish
アスピリン坐薬	Ibuprofen（イブプロフェン）	Vitro-Med タブレット
バイエル子供用風邪薬タブレット	Indocin（インドシン）	Vioxx（バイオックス）
Brilinta（ブリリント）	Midol（マイドール）	Voltaren（ボルタレン）
Buff-A-Comp	Motrin Naprosyn（モトリンナプロシン）	Warfarin（ワルファリン）
バファリン	Norgesic（ノジシック）	イグザレルト（リバーロキサバン）2~3日間
Cama Inlay タブレット	オメガ3脂肪酸	Zorprinn（ゾルピリン）
Celebrex（セレブレックス）	Pabirin	
Clopidogrel（クロピドグレル）	Pacaps	<u>ハーブ</u>
Congesperin	Panalgesic	特定の漢方薬
Cordicin 製品	Pedrazil	ニンニクの錠剤
Cordicin（クマディン）5日間	Percodan	朝鮮人参の錠剤
ASAを含むDarvon	Persistin	銀杏の錠剤
Dristan（ドリスタン）	Plavix（プラビックス）5~7日間	生姜の錠剤
Ecotrin（エクトリン）	Pradaxa（ダビガトラン）	
Edoxaban（エドキサバン）	Quiet World Analgesic	<b>Tylenol（タイレノール）は手術前に摂取で</b>
エリキユース（アピキサバン）	Robaxisal	<b>きます。</b>

新しい糖尿病治療薬や体重管理を目的とする治療薬も手術前に中止する必要がある場合があります。

**GLP アゴニストは手術前に中止する必要があります。**

週に1回服用する場合は、手術の1週間前に服用を中止してください。

毎日服用する場合は、手術の1日前に服用を中止してください。

デュラグルチド（トルリシティ）（週に1回注射）  
エキセナチド徐放製剤（ビデュリオン）（週に1回注射）  
エクセナチド（バイエッタ）（1日2回注射）  
セマグルチド（オゼンピック）（週に1回注射）  
セマグルチド（リベルサス）（1日1回経口服用）  
セマグルチド（ウゴービ）（週に1回注射）  
リラグルチド（ビクトーザ、サクセンダ）（1日1回注射）  
リキシセナチド（アドリキシン）（1日1回注射）  
チルゼパチド（マンジャロ）（週に1回注射）

**経口 SGLT2 阻害剤は、全身麻酔による手術の前に中止する必要があります。**

ベキサグリフロジン（ブレンザビィ）は手術の3日前から中止します。

カナグリフロジン（インボカナ）は手術の3日前から中止します。

ダパグリフロジン（フォシーガ）は手術の3日前から中止します。

エンパグリフロジン（ジャディアンス）は手術の3日前から中止します。

エルツグリフロジン（ステグラトロ）は手術の4日前から中止します。