

Silkiss Eye Surgery
400 – 29th Street, Suite 315, Oakland, CA 94609
Teléfono 510-763-0881 / Fax 510-763-0907

No ingiera aspirinas ni medicamentos antiinflamatorios no esteroideos dos semanas antes de la cirugía. Si usted está en tratamiento con Coumadin, Plavix, Aggrenox, u otro medicamento anticoagulante (ver ejemplos abajo), consulte a su médico cuánto tiempo antes de la cirugía debe discontinuar la ingesta; puede ser menos de dos semanas. Puede retomar el tratamiento con anticoagulantes, aspirinas y antiinflamatorios no esteroideos **el día después** de la cirugía. La ingesta de otros medicamentos puede continuar en su esquema habitual.

Advil	Empirin	Savaysa (Edoxaban)
Aggrenox	Emprazil	Somníferos
Aleve	Equagesic	Comprimidos para el resfriado St.
Alka Seltzer	Excedrin	Joseph
Anacin	Fiogesic	Comprimidos para el resfriado
Anaprox	Fiorinal	Sine-Off
APC	Aceite de pescado	Polvos analgésicos Stanback
Arthritis Pain Formula	Aceite de linaza	Supac
Arthritis Strength Bufferin	Comprimidos para el resfriado 4-Way	Synalgos
Ascriptin	Polvo para el dolor de cabeza Goody's	Ticlid
Aspirin	Ibuprofen	Triaminicin en comprimidos
Aspirin en supositorios	Indocin	Vanquish
Comprimidos para el resfriado para niños Bayer	Midol	Vitro-Med en comprimidos
Brilinta	Motrin	Vioxx
Buff-A-Comp	Naprosyn	Voltaren
Bufferin	Norgesic	Warfarin
Cama en comprimidos de incrustación	Ácidos grasos omega-3	Xarelto (Rivaroxaban) 2 a 3 días
Celebrex	Pabirin	Zorprin
Clopidogrel	Pacaps	
Congesperin	Panalgesic	<u>HIERBAS</u>
Productos Coricidin	Pedrazil	Algunas hierbas chinas
Coumadin 5 días	Percodan	Píldoras de Garlic
Darvon with ASA	Persistin	Píldoras de Ginseng
Dristan	Plavix 5 a 7 días	Píldoras de Gingko
Ecotrin	Pradaxa (Dabigatran)	Píldoras de Ginger
Edoxaban	Quiet World Analgesic	
Eliquis (Apixaban)	Robaxisal	Puede tomar Tylenol antes de la cirugía.

Puede ser necesario interrumpir la toma de medicamentos para la diabetes y la pérdida de peso antes de la cirugía

Los agonistas del GLP deben interrumpirse antes de la cirugía.

Si toma una dosis semanal, interrumpa la toma una semana antes de la cirugía.

Si toma una dosis diaria, interrumpa la toma un día antes de la cirugía.

Dulaglutide (Trulicity) (inyección semanal)
Exenatide de liberación prolongada (Bydureon) (inyección semanal)
Exenatide (Byetta) (inyección dos veces al día)
Semaglutide (Ozempic) (inyección semanal)
Semaglutide (Rybelsus) (vía oral una vez al día)
Semaglutide (Wegovy) (inyección semanal)
Liraglutide (Victoza, Saxenda) (inyección una vez al día)
Lixisenatide (Adlyxin) (inyección una vez al día)
Tirzepatide (Mounjaro) (inyección semanal)

Los inhibidores de SGLT2 por vía oral deben interrumpirse antes de una cirugía con anestesia general.

Bexagliflozin (Brenzavvy) INTERRUMPIR 3 días antes de la cirugía.
Canagliflozin (Invokana) INTERRUMPIR 3 días antes de la cirugía.
Dapagliflozin (Farxiga) INTERRUMPIR 3 días antes de la cirugía.
Empagliflozin (Jardiance) INTERRUMPIR 3 días antes de la cirugía.
Ertugliflozin (Steglatro) INTERRUMPIR 4 días antes de la cirugía.